

SOLVIGO EST UN PUISSANT INSECTICIDE-ACARICIDE POUR LE  
CONTRÔLE DE PLUSIEURS RAVAGEURS DES ARBRES FRUITIERS  
القوة و الدقة ضدّ الحشرات الضّارة في بساتين  
الأشجار المثمرة

syngenta®

 **Cotugrain** Impex

Téléphone : +216 71 42 63 13  
Fax : +216 71 42 66 44  
Email : info@cotugrain.com.tn  
Adresse : Zone Industrielle St Gobain  
Mégrine 2014, Ben Arous - TUNISIE

**syngenta**

Syngenta Agro AG, Basel Branch,  
Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Bâle, Suisse  
Fax : 023 71 36 36


 **Solvigo**™

Contient : Abamectine 33 g / l  
et Thiamethoxam 152 g / l  
Homologation : I.008-18

Marque enregistrée d'une société  
du Group Syngenta



SOLVIGO EST UN PUISSANT INSECTICIDE-ACARICIDE POUR LE  
CONTRÔLE DE PLUSIEURS RAVAGEURS DES ARBRES FRUITIERS  
القوة و الدقة ضدّ الحشرات الضّارة في بساتين  
الأشجار المثمرة

 **Solvigo**™

syngenta®



**SOLVIGO est un puissant insecticide-acaricide pour le contrôle de plusieurs ravageurs des arbres fruitiers.**  
SOLVIGO agit sur toutes les étapes du cycle biologique de nombreux insectes des arbres fruitiers et des cultures maraichère (œuf, nymphe et adulte)

سولفيكو مبيد عنكب و حشرات قوي للتحكم في العديد من الافات في محاصيل الاشجار المثمرة.  
سولفيكو يؤثر على كل مراحل الدورة الحياتية لعديد حشرات الاشجار المثمرة و الخضروات (بيضة، حورية وحشرة بالغة)

## Caractéristiques et Avantages

|   |   |
|---|---|
| Cultures cibles                           | Agrumes-Cultures légumières<br>pomme de terre- Oignon-Tomate<br>Concombre-Haricot                                       |
| Solution complète au principaux ravageurs | Aleurode – Puceron – Cicadelle –<br>Thrips – Mineuse – Acariens   |
| Intervalle minimum entre les applications | 30 jours pour SOLVIGO ou autres produits contenant Abamectine<br>07 jours pour autres produits qui contient Thiametoxam |
| Délai avant récolte (DrL)                 | 07 jours  |

**Mouvement translaminaire : pénétration foliaire rapide**

**SOLVIGO =**



ABAMECTINE 33 g / l

+

THIAMETHOXAM 152 g / l



**SOLVIGO, 0.5 l/ha contre les acarions, les mineuses, les aleurodes et le pucerons des Agrumes**



## Dosage

| CULTURE | RAVAGEUR                     | DOSE D'EMPLOI | D.A.R    |
|---------|------------------------------|---------------|----------|
| AGRUME  | Acariens Tetranychus urticae | 0.5 l/ha      | 07 JOURS |
| AGRUME  | Mineuses                     | 0.5 l/ha      | 07 JOURS |

## المميزات و الخصائص

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| المحاصيل المستهدفة                 | الحمضيات - الخضروات - البطاطا - البصل - الطماطم - الخيار - الفاصوليا        |
| الحل المتكامل للآفات               | الذبابة البيضاء - قفازات الأوراق - المن - التريبس - حفارات الأوراق - العنكب |
| الحد الأدنى بين فترات تطبيق المبيد | 30 يوما بالنسبة لاقريفلكس أو مبيد آخر يحتوي على تياميتوكسام                 |
| قترة ما قبل الجني                  | 7 أيام بالنسبة لمبيد آخر يحتوي على تياميتوكسام                              |
|                                    | 7 أيام  |

محلول معلق مركز - منتج باستخدام تكنولوجيا حصرية للتصنيع لضمان أفضل واسرع انتقال داخلي للمبيد

تياميتوكسام 152 غ/ل


+

ابامكتين 33 غ/ل

**= سولفيكو**


## مفعول سولفيكو على حشرات الطماطم

Section transversale de la feuille  
مقطع عرضي للورقة



SOLVIGO a une bonne activité translaminaire

سولفيكو خاصة انتشار سريعة داخل الورقة :  
امتصاص سريع للمادة الفعالة



SOLVIGO contrôle les mouches blanches, les thrips, les acarions et les mineuses des feuilles en même temps sur la culture de tomates.

## المقادير

| المحصول | الآفة          | الجرعة   | فترة الإنتظار قبل الجني |
|---------|----------------|----------|-------------------------|
| القوارص | القراديات      | 0,5 ل/هك | 07 أيام                 |
| القوارص | حفارات الأوراق | 0,5 ل/هك | 07 أيام                 |