

Haut niveau
d'efficacité ...

Hexagon®

FONGICIDE CONTRE L'OÏDIUM ET LE BOTRYTIS



Hexagon®

FONGICIDE CONTRE
L'OÏDIUM ET LE BOTRYTIS



Z.I Saint Gobain, 2014 -
Mégrine - Tunis - TUNISIE



Tél.: (+216) 71 426 313
Fax.: (+216) 71 426 644



f Cotugrain
www.cotugrain.com.tn
info@cotugrain.com.tn



PRÉSENTATION

مميزات هكساكون

Hexagon® est un fongicide efficace contre l'oïdium des cucurbitacées et de la vigne qui associe l'action préventive . Du boscalid aux actions préventive et curative du krésoxim-méthyl. Elle diffuse de manière différente : les particules de krésoxim-méthyl adsorbées sur la cuticule du végétale sont libérées de manière lente et progressive, ce qui contribue à sa grande persistance d'action. Pour le boscalid, une partie du produit appliqué sur la feuille est absorbée et diffuse de manière translaminaire dans les tissus de la feuille vers la face opposée. L'autre partie est véhiculée par la plante de façon systématique vers les extrémités des feuilles. La complémentarité des deux substances actives à différents niveaux du cycle de l'oïdium se traduit par un niveau d'efficacité, une bonne persistance d'action et un intérêt marqué dans le cadre de la gestion de la résistance.

• هيكساكون مبيد فطري ذو فعالية عالية ضد مرض البياض الدقيقي و البوتريتيس بزراعة العنب يجمع بين الخاصية الوقائية لمادة البوسكاليد و الخاصيات العلاجية و الوقائية لمادة الكريزوكسيم متيل

• هاتان المادتان المكونتان لهذا المبيد يعملان بطريقة متكاملة و يؤثران على الفطر في أماكن مختلفة مما يعطي فعالية كبيرة و متكاملة

• بالإضافة إلى أن طريقة التسرب و الإنتقال المتجانسة للمادتين في النبات تجعل مدة الفعالية طويلة بشكل مهم

MODE D'ACTION

DU PRODUIT كيفية التأثير

- Hexagon® s'utilise en 2-3 applications non consécutives par programme.
- Sa persistance d'action est de l'ordre de 7 à 10 jours.
- Sous serre, il est nécessaire de renouveler la protection préventive à une cadence plus resserrée, de 7 jours, en gardant la même dose par hectare.

• يستعمل في مرحلة الإزدهار و النضج

• لا تقم بإجراء أكثر من علاجين متعاقبين لهيكساكون قبل أن تتناوب مع مبيد فطري ذو طريقة تأثير مختلفة

• مدة الفعالية تصل من 7 إلى 10 أيام


DIFFUSION DANS LA PLANTE

الإنتشار في النبتة

Les deux molécules de Hexagon lui confèrent une très bonne mobilité dans la plante après traitement:

• Le produit se fixe facilement sur la cuticule de végétal et bénéficie en suite d'une diffusion à la fois acropétale (vers l'extrémité de la plante) et translaminaire (de la face supérieure des feuilles vers la face inférieure), dans tous les organes de la plante.

• Il laisse également un voile protecteur à proximité directe des organes traités.



FICHE D'IDENTITÉ

تعريف هكساكون

Composition : 200 g/l Boscalid + 100 g/l Hrésoxim-méthyl

Formulation : Suspension concentrée (SC)

Homologation en tunisie n°: Vigne d'Oïdium: 40 cc/hl, 3 applications maximum par saison

DOSAGE


معدل و تعليمات الإستعمال

Cultures الزراعات	Organismes nuisibles / Utulisation	الآفات / الاستخدام	Dose جرعة	Nbre de trait. / Campagne عدد التطبيقات	DAR (Jours) فترة الأمان (الأيام)
Vigne العنب	Oïdium البياض الدقيقي		40 cc/hl 40 ملتر في 100 لتر من الماء	2 - 3	28
	Botrytis البوتريتيس		40 cc/hl 40 ملتر في 100 لتر من الماء	2 - 3	28

Stade d'application: stade floraison
Hexagon® doit être appliqué prioritairement en préventif.

STADES DE CROISSANCE (BBCH)

مراحل النمو



Délai avant récolte: 28 jours.